



De **Olho** na **carteirinha**

Operacionalização Varicela – Atualização

06/03/2025

Programa Municipal de Imunizações
DVE/Covisa/SMS/SP

8ª Versão



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

I. Introdução

A vacina varicela, introduzida no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 2013, atualmente indicada em esquema de duas doses (a primeira aos 15 meses e a segunda aos 04 anos de idade), está em situação de desabastecimento temporário conforme apontado em Ofício nº 105/2023/CGICI/DPNI/SVSA/MS e NOTA TÉCNICA N°56/2023-CGGI/DPNI/SVSA/MS, de tal forma que se fez necessária adoção de um Plano de Contingência no município de São Paulo (MSP) para a utilização das doses então disponíveis em estoque.

A Nota Técnica nº 89/2024-DPNI/SVSA/MS orienta a substituição de vacinas em situações especiais, tais como de desabastecimentos e autoriza a aplicação de Tetraviral tanto para D1, quanto para D2, na falta da vacina varicela.

Sendo assim, o Programa Municipal de Imunizações (PMI) da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), considerando a demanda atual e as últimas remessas de vacina Tetraviral recebidas, vem por meio deste reorientar as ações de vacinação contra a varicela no MSP, conforme orientação do MS – PNI - Programa Nacional de Imunizações.

II. Estratégia de vacinação

Aplicação de D1 e D2 em todos os serviços de vacinação, por demanda espontânea, conforme calendário de vacinação (vide quadro 1 abaixo).

Vacinação de 50% das crianças que estão em lista de espera para aplicação de D2 da vacina varicela. Devem ser convocados por ordem de inclusão na lista (os mais antigos primeiro).

Deverá ser realizada a busca ativa dessas crianças através de ligação telefônica, busca casa a casa, ações em escolas.

Quadro 1 – Esquema de vacinação contra a varicela

| ESQUEMA DE VACINAÇÃO CONTRA A VARICELA | | | | |
|--|------------|---|------------------|------------|
| Idade | Vacina | Observação | Registro no SIGA | |
| | | | Estratégia | Dose |
| 15 meses | Tetraviral | Administrar uma dose em crianças que já tenham recebido a primeira dose da tríplice viral (SCR) | Rotina | Dose Única |
| 4 anos | Varicela | Na indisponibilidade, utilizar a vacina tetraviral em substituição à vacina varicela em crianças a partir dos 4 anos de idade previamente vacinadas com pelo menos uma dose de tríplice viral (SCR) | Rotina | Dose Única |

Fonte: PNI, adaptado

** Conforme disponibilidade de estoque

III. Período

Esta estratégia de vacinação deve ser realizada até **31/03/2025**.