

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21/05/2024  
Atualizado em: 20/09/2024



## INTRODUÇÃO

A estratégia de vacinação contra a covid-19 segue as novas recomendações do Ministério da Saúde no documento *ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – 2024*, e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com a **introdução da vacina Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna**, disponível nos link:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/informes-tecnicos/informe-tecnico-vacina-covid-xbb/view>

## FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

### -Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira - Horário: das 7h às 19h.

### -AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

MAIS INFORMAÇÕES:



# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21/05/2024  
Atualizado em: 20/09/2024



## POPULAÇÃO PRIORITÁRIA – CALENDÁRIO NACIONAL - ROTINA

### Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias:

- Crianças que nunca receberam alguma dose da vacina covid-19 deverão receber duas doses da vacina covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna.;
- Crianças completamente vacinadas com vacinas Covid-19 originais (três doses) deverão receber mais uma dose da vacina covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna;
- Crianças **imunocomprometidas** que nunca se vacinaram deverão receber o esquema primário de três doses da vacina Covid19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna.

### POPULAÇÃO PRIORITÁRIA - CRIANÇAS DE 6 MESES a 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

IDADE	QUANTIDADES DE DOSES DA MODERNA	INTERVALO ENTRE AS DOSES
Crianças SEM vacinação prévia	2 doses	D2 quatro semanas após a D1.
Crianças COM vacinação prévia completa*	1 dose	Após 3 meses da dose mais recente.
Crianças COM vacinação prévia incompleta*	1 dose anterior – deve tomar 2 doses da Moderna - 2 doses anteriores – Tomar 1 dose da moderna	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
Crianças Imunocomprometidas SEM vacinação prévia*	3 doses	D2 quatro semanas após a D1. D3 oito semanas após a D2.
Crianças Imunocomprometidas COM vacinação prévia COMPLETA*	1 dose	Após 3 meses da dose mais recente.
Crianças Imunocomprometidas COM vacinação prévia INCOMPLETA*	1 dose anterior – deve tomar 2 doses da Moderna - 2 doses anteriores – Tomar 1 dose da moderna	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas

\* Consultar os esquemas recomendados para determinadas situações e históricos vacinais no Documento Técnico do Programa Municipal de Imunizações.

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21/05/2024  
Atualizado em: 20/09/2024



## GRUPOS PRIORITÁRIOS – DOSES DE REFORÇO

Os grupos prioritários são pessoas com 5 anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença. Qualquer pessoa do grupo prioritário está apta para receber uma dose da Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna. Essas populações têm indicação de dose anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo.

### GRUPOS PRIORITÁRIOS - REFORÇO

GRUPO PRIORITÁRIO	INTERVALO ENTRE AS DOSES
Pessoas de 60 anos ou mais	6 meses
Imunocomprometidos*	
Gestantes e puérperas	
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores	Anual
Indígenas, Quilombolas e Ribeirinhos	
Trabalhadores da saúde****	
Pessoas com deficiência permanente**	
Pessoas com comorbidades***	
Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos)	
Funcionários do sistema de privação de liberdade	
Adolescentes cumprindo medidas Socioeducativas	
Pessoas em situação de rua	

#### Observação:

1- Pessoas não vacinadas deverão receber UMA DOSE da vacina Covid-19 XBB 1.5, da fabricante Moderna, com a dose e a formulação recomendadas para a idade;

2- Pessoas que receberam uma ou mais doses de qualquer vacina Covid-19 de cepa original (Wuhan) ou bivalente deverão receber UMA DOSE da vacina Covid-19 XBB, da fabricante Moderna, no ano de 2024. Se forem pessoas com 60 anos ou mais, gestantes/puérperas ou imunocomprometidos, deverão receber DUAS DOSES de vacinas Covid-19 XBB, da fabricante Moderna, no ano de 2024, com intervalo mínimo de seis meses entre as duas doses;

3- O intervalo mínimo recomendado entre a última dose de qualquer vacina Covid-19 (cepa original) e a vacina covid-19 da fabricante Moderna, é de três meses.

### IMUNOCOMPROMETIDOS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE

Situação	QUANTIDADES DE DOSES DA MODERNA	INTERVALO ENTRE AS DOSES
Imunocomprometidos SEM vacinação prévia	3 doses	D1 para D2 - 4 semanas D2 para D3 - 8 semanas
Crianças Imunocomprometidas COM UMA dose prévia	2 doses	D1 para D2 - 4 semanas D2 para D3 - 8 semanas
Crianças Imunocomprometidas COM DUAS doses prévias	1 dose	Intervalo de três meses após a última dose de qualquer vacina (cepa original)

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21/05/2024  
Atualizado em: 20/09/2024



## PÚBLICO GERAL

Se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente (nenhuma dose prévia da vacina contra a covid-19) optar por se vacinar, poderá receber **UMA** dose da vacina covid-19 covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna.

### PÚBLICO GERAL (NÃO VACINADO ANTERIORMENTE)

VACINA	IDADE RECOMENDADA	Esquema Vacinal
Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna	A partir de 5 anos de idade	1 dose

## CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS PRIORITÁRIOS

### **\*Pessoas imunocomprometidas:**

- Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea
- Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
- Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses  $\geq 20$  mg/dia de prednisona, ou equivalente, por  $\geq 14$  dias
- Crianças: doses de prednisona, ou equivalente,  $\geq 2$ mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg.
- Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão
- Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias)
- Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise
- Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento
- Pessoas com neoplasias hematológicas

### **\*\*Pessoas com deficiência permanente:**

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A condição "deficiência permanente" para a finalidade deste documento será autodeclarada. Este grupo inclui pessoas com:

- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.
- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.
- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.
- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

### **\*\*\*Comorbidades:**

Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de down; Cirrose hepática; Autismo

# INSTRUTIVO DA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 MONOVALENTE XBB EM 2024

**VACINA  
SAMPA**

Instrutivo nº 02/2024  
Publicado em: 21/05/2024  
Atualizado em: 20/09/2024



## CARACTERIZAÇÃO DE GRUPOS PRIORITÁRIOS

### \*Pessoas imunocomprometidas:

- Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea
- Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
- Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses  $\geq 20$  mg/dia de prednisona, ou equivalente, por  $\geq 14$  dias
- Crianças: doses de prednisona, ou equivalente,  $\geq 2$ mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg.
- Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão
- Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias)
- Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise
- Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento
- Pessoas com neoplasias hematológicas

### \*\*Pessoas com deficiência permanente:

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A condição "deficiência permanente" para a finalidade deste documento será autodeclarada. Este grupo inclui pessoas com:

- Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.
- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.
- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.
- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

### \*\*\*Comorbidades:

Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de down; Cirrose hepática; Autismo.

### \*\*\*\* Trabalhadores da Saúde:

Indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde, ou seja, que atuam em estabelecimentos de serviços de saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros. Além desses, são considerados ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os que atuam em programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiros, estagiários ou residentes das profissões das áreas de saúde que estão atuando nos serviços de saúde bem como familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado (não estão inclusos todos os contatos domiciliares desses indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado). Também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde.