

QUADRO GERAL DE DTHA MAIS FREQUENTES

Quadro 1 - Início, Duração e Sintomas dos principais Agentes Etiológicos das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA)

INÍCIO DOS SINTOMAS (TEMPO APROXIMADO)	SINAIS E SINTOMAS PRINCIPAIS	MICROORGANISMOS RELACIONADOS, TOXINAS OU OUTROS
Sintomas do trato gastrointestinal superior (náusea e vômitos) como primeiros sintomas ou predominantes		
1-6 horas (média de 2-4 horas)	Náusea, vômito, ânsia de vomitar, diarreia, dor abdominal, prostração	Staphylococcus aureus e suas enterotoxinas e B. cereus (toxinas vomitivas)
Sintomas do trato gastrointestinal baixo como primeira ocorrência ou predominância (cólicas abdominais, diarreia)		
2-36 horas (média de 6-12 horas)	Cólicas abdominais, diarreia, diarreia putrefata (associada com o C. perfringens), algumas vezes náuseas e vômitos	Clostridium perfringens, Bacillus cereus (toxina diarreica)
12-74 horas (média de 18-36 horas)	Cólicas abdominais, diarreia, vômito, febre, calafrios, dor de cabeça, náusea, mal estar. Algumas vezes, diarreia com sangue ou muco, lesão cutânea(associada com V. vulnificus).	Várias espécies de Salmonellas, Shigella, E. coli enteropatogênica, outras enterobacteriaceas, Vibrio cholerae (O1 e não-O1), V. vulnificus
2-5 dias	Diarreia, febre, vômito, dor abdominal, sintomas respiratórios	Viroses entéricas (NOROVÍRUS, ROTAVÍRUS)

Fonte: Tradução e adaptação do quadro apresentado pelo FDA/CFSAN Bad Book Book - Onset, Duration, and s...<http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/app2.html>