



De Olho na carteirinha

**ORIENTAÇÕES PARA A
VACINAÇÃO COM A TRÍPLICE
VIRAL**

05/12/2024

1. Introdução

A vacina tríplice viral (SCR) está indicada para a proteção contra sarampo, caxumba e rubéola e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação, e o esquema de vacinação, na rotina dos serviços de saúde, segue no quadro abaixo:

Estratégia de vacinação para população em geral (Calendário PNI Programa Nacional de Imunizações)

Estratégia de vacinação - Rotina	
Crianças de 12 meses	Dose 1
Crianças de 15 meses	Dose 2
Vacinação de pessoas de 15 meses a 29 anos de idade (sem esquema vacinal básico completo) e profissionais de saúde	Duas doses
Pessoas a partir 30 anos de idade até os nascidos a partir de 1960 (sem esquema vacinal básico completo)	Dose única

2. Vacinas disponíveis

No Brasil, via Programa Nacional de Imunizações (PNI), são disponibilizadas vacinas SCR dos produtores Serum Institute of India Ltd (uso a partir de 9 meses de idade) e da Fiocruz/Biomanguinhos (uso a partir de 6 meses de idade).

A vacina do produtor Serum Institute of India Ltd tem, em sua composição, a presença de lactoalbumina hidrolisada, que está associada às manifestações anafiláticas em pessoas que apresentam alergia ao leite de vaca.

Como precaução, o Ministério da Saúde recomenda que todos os usuários com história de alergia ao leite de vaca **não sejam vacinados** com a vacina tríplice viral do produtor Serum Institute of India Ltd.

Assim, previamente à administração da vacina SCR deve ser realizada uma triagem individual para identificação de indivíduos com o diagnóstico de alergia ao leite de vaca ou que já apresentaram sintomas de anafilaxia, tais como urticária generalizada, edema labial ou orbital, problema respiratório ou sinais de choque nas primeiras horas após a ingestão ou contato com alimentos lácteos.

3. Operacionalização

Tendo em vista que, na rotina de abastecimento, é enviada aos serviços a vacina SCR do Serum Institute of India Ltd, identificando-se um indivíduo com o diagnóstico ou quadro acima descritos, deve-se realizar a solicitação da vacina SCR do laboratório Fiocruz/Biomanguinhos ao Padi de referência, que fará a liberação específica para esse usuário.

4. Procedimentos

4.1. O profissional da unidade faz a triagem daqueles pacientes com indicação de vacinação com a SCR, perguntando ao indivíduo, pais ou responsáveis se há o diagnóstico de alergia ao leite de vaca ou se já apresentaram sintomas de anafilaxia após a ingestão desse.

4.2. Havendo uma resposta afirmativa, o profissional não realizará a aplicação da vacina SCR do Serum Institute of India Ltd e comunicará ao usuário que será feita a solicitação de vacina específica para sua situação. Anotar, em planilha nominal, os dados do paciente para convocação.

4.3. Enviar o pedido de vacina SCR da Fiocruz/Biomanguinhos ao Padi de referência, informando os dados do paciente e a unidade de aplicação.

4.4. O Padi providenciará, com brevidade, o envio dessa vacina à unidade requisitante.

4.5. A unidade, ao receber a vacina, convocará o paciente.

Referência:

Brasil. Comunicado. Recomendações para a vacinação tríplice viral no Brasil. secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento do Programa de Imunizações. Brasília: MS, 2024.

***Programa Municipal de Imunizações-PMI
Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE
Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA
Secretaria Municipal de Saúde -São Paulo – SMS***

05 de dezembro de 2024.